


10

Objawów Ostrzegawczych Pierwotnego Niedoboru Odporności

Pierwotny Niedobór Odporności (PNO; Primary Immunodeficiency; PID) sprawia, że dzieci i dorośli cierpią na często nawracające lub trudne do leczenia infekcje. 1:500 osób jest dotknięta jednym ze znanych Pierwotnych Niedoborów Odporności. **Jeśli u ciebie lub bliskiej ci osoby występują dwa lub więcej z poniższych objawów ostrzegawczych, porozmawiaj z lekarzem i zapytaj, czy ewentualną przyczyną tego stanu nie jest Pierwotny Niedobór Odporności.**




Cztery lub więcej nowych zakażeń ucha w ciągu roku.



Dwa lub więcej poważnych zakażeń zatok w ciągu roku.




Stosowanie antybiotyku przez dwa miesiące lub dłużej z niewielkim efektem.



Dwa lub więcej zapaleń płuc w ciągu roku.




Nieprzybieranie na wadze lub zahamowanie prawidłowego rozwoju dziecka.



Nawracające, głębokie ropnie skóry lub innych narządów.



Uporczywe pleśniawki w jamie ustnej lub zakażenia grzybicze na skórze.



Konieczność stosowania antybiotyków dożylnych do leczenia zakażenia.



Dwa lub więcej zakażeń tkanek głębokich, w tym posocznica.



PNO
w wywiadzie rodzinnym.



Jeffrey Modell
Foundation

Curing P.I.
Worldwide.

immunoprotect

Powyższe objawy ostrzegawcze zostały opracowane przez Medyczny Komitet Doradczy Fundacji im. Jeffreya Modella. Zdecydowanie zaleca się konsultację ze specjalistami w dziedzinie pierwotnych niedoborów odporności.
© 2010 Jeffrey Modell Foundation

Więcej informacji na stronie Organizacji zrzeszającej pacjentów z PNO:

www.immunoprotect.pl